

# Morphologie comparée des genres d'hydrophytes vasculaires (non marins) du Massif Armoricain et régions voisines.

dernière mise à jour 2015, Daniel Chicouène, dc.plantouz

## Plan de cette page :

- introduction, légende, p.1
- Tableau comparatif des 2 types de pousses des Helobiae apétales p.2
- tableau I : Appareil végétatif p.3
- tableau II : Appareil reproducteur p.4

NB : des tableaux comparatifs des espèces sont également disponibles pour certains genres ou familles dans les pages correspondantes

*Polygonum*,  
*Nuphar*,  
*Ceratophyllum*,  
*Batrachium*,  
*Rorippa*,  
*Elatine*,  
*Ludwigia*  
*Myriophyllum*,  
*Oenanthe*,  
*Alismataceae* (*Sagittaria*, *Baldellia*, *Luronium*, *Damasonium*, *Caldesia*)  
*Juncus*,  
*Cyperaceae* (*Scirpus*, *Eleocharis*),  
*Graminées* : *Glyceria*, *Alopecurus*,...  
*Sparganium*,  
*Typha*  
...

## Légende et présentation :

colonne « genres » : classification proche de Flora Europaea

- Pteridophyta
- Dicotylédones A- et Dialypétales, Gamopétales
- Monocotylédones (surtout Helobiae)

Il manque quelques plantes rares (Isoetes, Lobelia,...)

L'architecture des Helobiae sans pétales en particulier (cf tableau ci-dessous) (s'en rapprochent : certains *Juncus*, *Catabrosa*, certaines Cypéracées, *Hippuris*...) repose surtout sur 2 types de pousses végétatives :

- Une **tige plagiotope** allongée portant des racines, et sympodiale (le plus souvent au bout de 2 entrenœuds), à feuilles alternes régulièrement, sans limbe (il y a une préfeuille, rudimentaire, et souvent une autre (rarement plus) cataphylle par pousse). La ramification est souvent extra-axillaire.

Cette pousse plagiotope peut être souterraine (rhizome passant l'hiver), ou en stolon sur le substrat (plante généralement avec turions).

-Chaque portion monopodiale se termine en **pousse orthotrophe**, à feuilles avec limbe ; et au moins les feuilles situées juste sous l'inflorescence sont subopposées.

Cette description de l'architecture date du XIXème siècle, avec Irmisch (1858 ...), Sauvageau (1891, 1893 ...).

Comparaison des 2 types de pousses des Helobiae apétales		
	tige plagiotrope	pousse orthotrophe
longueur des tiges	allongée (et nombreux entre-noeuds)	+ - allongée
régularité de longueur des entre-noeuds	régulier	au moins les feuilles situées juste sous l'inflorescence sont subopposées, parfois toutes subopposées
emplacement des racines	au moins certains nœuds avec racines allant dans le substrat	sans racines
ramification	sympodiale (le plus souvent au bout de 2 entre-noeuds, rarement plus ou 1) ; souvent extra-axillaire	monopodiale
type de feuilles	cataphylles = sans limbe ; il y a une préfeuille, rudimentaire, et souvent une autre (rarement plus) cataphylle par pousse	avec limbe (la littérature peut contenir des confusions (entre les autres parties) gaine, stipules, oreillettes, préfeuilles
apex	s'allonge indéfiniment en rhizome passant une saison de +- repos (= sans production d'infl.) ou forme un stolon sur le substrat (plantes généralement avec turions pour la saison de repos	inflorescence(-s) : généralement un épi, -si pousse simple = 1 inflorescence -si pousse ramifiée = plusieurs infloresc.

colonne "souterrain" :

R : racines

rh. : rhizomes

colonne « tiges végétatives » :

oligo. = entre-noeuds oligomères (= peu nombreux)

colonne "disposition" :

1 : alterne (1 par noeud) et différent de 1/2 et de 1/3

o-o : opposé

colonne "inflorescence" :

1 : 1 fleur par inflorescence

colonne "symétrie" :

o : axiale

·l· : bilatérale

colonne "sexe" :

D : dioïque

H : hermaphrodite

M : monoïque

colonne "placentation" :

ax. : axile















© : centrale

par. : pariétale

colonne "gynécée"

C : carpelles .

APPAREIL VEGETATIF

	souterrain	tiges végétatives aquatiques	disposition	FEUILLES gaine stipules	limbe milieu	limbe	ordre de l.
<i>Pilularia</i>	R	stolon au fond	1		var.	cylindrique circiné	dm
<i>Azolla</i>	-	stolon flottant	1		var.	cucullé	mm
<i>Polygonum</i>	rh.(ou R)	(stolon nageant)	1	gaine prolongée	var.	lancéolé	 dm
<i>Nymphaea</i>	(rh.)	stolon pachy. au fond)	1	(1 'stipule')	nag.,flot.	flottant en coeur	dm
<i>Nuphar</i>	(rh.)	stolon pachy. au fond)	1	(gaine)	nag.,flot.	flottant en coeur	 dm
<i>Ceratophyllum</i>	(pousses rhizoïdes)	stolon nageant	verticillé	0	var.	multifide dichotomique	 qq cm
<i>Batrachium</i>	R	stolon nageant,fond	1	( )	var.	multif.et/ou palmé lobé	qq cm
<i>Rorippa</i>	R ou R traçante	rosette (stolon au fond)	1	0	aér.	+lobé pectiné	dm
<i>Nasturtium</i>	R	stolon au fond, nag.	1	0	nag.,aér.	pectiné +- lobé ou folioles arrond	dm
<i>Crassula</i>	R (rh pp ?)	stolon au fond, nag.	o—o	0	nag.,aér.	entier, linéaire-ovale	cm
<i>Hypericum elodes</i>	R (rh.)	stolon nageant, fond	o—o	0	nag.,aér.	entier, ovale	 cm
<i>Elatine</i>	R	stolon au fond	o—o ou vertic.	stipules petites	nag.,aér.	entier, ovale	(mm) cm
<i>Ludwigia Isnardia</i>	R	stolon au fond,nag.	o—o		nag.,aér.	+ ovale, pointu	qq cm
<i>Ludwigia Jussieua</i>	R(pneumatophore)	stolon au fond,nag.	1	stipules	var.	+ ovale, +-pointu	qq cm
<i>Trapa</i>	R	rosette et stolons flot.	1		nag.,flot.	simple losangique	 qq cm
<i>Myriophyllum</i>	rh.	stolon nageant	par 3-6	0	nag.(aér)	multifide 1 fois pectiné	 qq cm
<i>Hippuris</i>	rh.	pousse orthot.	par 8-12	0	surtt.aér.	linéaires	qq cm
<i>Hydrocotyle</i>	R (rh.-st.)	stolon au fond	1	(gaine)	surtt.aér.	pelté	qq cm
<i>Apium</i>	R	stolon au fond(nag.)	1	(gaine)	var.	composé penné	dm
<i>Sium</i>	rh.	rosette au fond	1	(gaine)	surtt.aér.	composé penné	dm
<i>Oenanthe</i>	R (parfs tub.)	rosette au fond(parfois stolon)	1	(gaine)	var.	composé penné	dm
<i>Hottonia</i>	(rh. ?)	stolon nageant	par 1 ou 5	0	nag.,flot.	multifide 1 fois pectiné	qq cm
<i>Menyanthes</i>	(rh.)	stolon(glt au fond)	± 1		surtt.aér.	trifoliolé	dm
<i>Nymphoides</i>	R(rh)	(stolon)	1(2=pousse fertile)		surtt.nag.	cœur	qq cm
<i>Callitriche</i>	(R)	stolon nageant(fond)	o—o	0	var.	ovale à lancéolé	 cm
<i>Veronica</i>	R	stolon au fond	o—o puis 1 in infl.	0	var.	ovale à lancéolé	cm dm
<i>Utricularia</i>	(pousses rhizoïdes)	(stolon nageant)	1	-	nag.	multifide +-dichotomique +utricul	cm
<i>Littorella</i>	(rh.)	rosette (stolon) au fond	1	(gaine)	nag.,aér.	linéaire	dm
<i>Sagittaria</i>	rh.à tub.	rosette au fond	1	(gaine)	var.	(linéaire)sagitté	qq dm
<i>Alisma s.s.</i>	R, tub.T	rosette au fond	1	(gaine)	var.	linéaire à elliptique	qq dm
<i>Baldellia</i>	R	rosette fond (stolon nag.oligo.)	1	(gaine)	var.	(linéaire) ovale	dm
<i>Luronium</i>	R	stolon fond, nag., oligo.	1	(gaine)	var.	(linéaire) ovale	dm
<i>Damasonium</i>	R	rosette fond (stolon nag.oligo.)	1	(gaine)	var.	(linéaire) ovale	qq cm
<i>Caldesia</i>	R	rosette au fond (stolon+- nageant)	1	(gaine)	var.	(linéaire) cœur	qq dm
<i>Butomus</i>	(rh.-st.pachy.)	fond	1	(gaine)	aér.	linéaire	qq dm
<i>Hydrocharis</i>	R	stolon nageant flottant	1	stipules	nag.,flot.	cœur	< dm
<i>Stratiotes</i>		rosette, stolon oligo.	1	-	nag.	linéaire-denticulé	dm
<i>Elodea</i>	(R)	stolon nageant	par (2)3-4	-	nag.	linéaire+-denticulé	cm
<i>Egeria</i>	(R)	stolon nageant	par (2)3-4	-	nag.	linéaire+-denticulé	cm
<i>Lagarosiphon</i>	(R)	stolon nageant	1	-	nag.	linéaire+-denticulé	cm
<i>Vallisneria</i>	R (rh.-st)	rosette fond-stolon	1	(gaine)	nag.	linéaire	qq dm
( <i>Aponogeton</i> )			1			simple	
<i>Potamogeton</i>	rh (R)	(stolon au fond) pousse nageant	distiq.(subopp.)	(gaine)(stipules)(lig.)	nag.,flot.	linéaire (étroit) à ovale	dm
<i>Ruppia</i>	rh.lepto.	pousse nageant	distiq.(subopp.)	gaine(ventru=infl.)	nag.	linéaire étroit	 qq cm
<i>Zannichellia</i>	(rh.lepto.)	stolon au fond + pousse nag.	distiq.(subopp.)	gaine-stipules	nag.	linéaire étroit (0 sur st.)	 qq cm
<i>Althenia</i>	R	stolon au fond + pousse nag.	distiq.(subopp.)	gaine	nag.	linéaire étroit aqua, 0 sur st.	 qq cm
<i>Najas</i>	R?	tige allongée	par 2-3	gaine courte	nag.	elliptique sinué-denté	qq cm
<i>Juncus</i>	R ou rh.	stolon ou rosette	distiq.	gaine (+ stipules)	var.	linéaire, en croissant ou en tube	dm
<i>Catabrosa</i>	R	stolon	distiq.	gaine,ligule	var.	linéaire caréné	dm
<i>Glyceria</i>	R ou rh.	rosette ou stolon nageant	distiq.	gaine,ligule	var.	linéaire caréné	dm
<i>Agrostis</i>	R	(rosette) stolon nageant	distiq.	gaine,ligule	var.	linéaire caréné	dm
<i>Antinoria agrostidea</i>	R	stolon nageant, fond	distiq.	gaine,ligule	var.	linéaire caréné	dm
<i>Alopecurus aequalis</i>	R	stolon nageant, fond	distiq.	gaine,ligule	surtt aér.	linéaire caréné	dm
<i>Scirpus Eleogiton fluitant</i>	R	stolon nageant, fond	distiq.	gaine	var.	linéaire plan	 dm
<i>Scirpus Schoenoplectus</i>	rh.	rosette au fond	tristiq.	gaine,ligule	var.	linéaire en V	 dm
<i>Eleocharis</i>	R ou rh.	rosette au fond	trist. difficile	gaine	-	ABSENT	0
<i>Sparganium</i>	rh.	rosette au fond	distiq.	gaine	var.	linéaire en V	 m
<i>Typha</i>	rh.	rosette au fond	distiq.	gaine	aér.dres.	linéaire en croissant	 m
<i>Lemnaceae</i>	-	(rosette )flottant,nageant(R)	<b>pas de vraies feuilles</b>		nag.flot.	(circulaire à elliptique)	mm

# APPAREIL REPRODUCTEUR

inflorescence	sym.	périanthe		sexes	E	infère placentat		gynécée	fruit	
		S	P							
								-	« globule sessile»	<i>Pilularia</i>
								-		<i>Azolla</i>
épi	o	5 T		H	(3)6-9	.		3 C, ovaires soudés	1 akène	<i>Polygonum</i>
1, flot.	o	4	n	H	n	(+)		nC, ovaires soudés	charnu, nrxn graines	<i>Nymphaea, Nuphar</i>
1, flot.	o	5	n	H	n	.		nC, ovaires soudés	charnu, nrxn graines	<i>Nymphaea, Nuphar</i>
glomérules sessiles	o	10-12	0	M	10-12	.		1?C 1 style	1 akène	<i>Ceratophyllum</i>
1	o	(4)5	5	H	n	.		1-n C libres, spiralés	akènes	<i>Batrachium</i>
grappe cylindrique	(o)	4	4	H	4+2	.	par.	2C soudés, 2 loges	sec, glt déhiscent	<i>Rorippa</i>
grappe cylindrique	(o)	4	4	H	4+2	.	par.	2C soudés, 2 loges	sec, glt déhiscent	<i>Nasturtium</i>
1	o	4	4	H	4	.		4C c. libres	c.follicules	<i>Crassula</i>
(cyme)	o	5	5	H	n*	.		3-5C, ovaires soudés	capsule	<i>Hypericum elodes</i>
(1), +- sessile	o	2-4	3-4	H	3-8	.	ax.	3-4C, ovaires soudés	capsule à n graines	<i>Elatine</i>
1, +- sessile	o	4	0	H	4	+	ax.	4C 1stigmate	capsule à n graines	<i>Ludwigia Isnardia</i>
1, court pédicelle	o	5	5	H	2x5	+	ax.	5C 1stigmate	capsule à n graines	<i>Ludwigia Jussieua</i>
1, court pédicelle	o	4	4	H	4	+	ax.	2C 1stigmate	(1 akène)	<i>Trapa</i>
épi		4	4	MH	8	≈		1?4C;stigmates glt libres,	±sec, 4graines	<i>Myriophyllum</i>
verticilles sessiles		absent		±M	1	+		1 style	±charnu, 1graine	<i>Hippuris</i>
ombelle	o-(o)	5	5	gltH	5	+		2 C, ovaires soudés	2 "akènes"	<i>Hydrocotyle</i>
double ombelle	o-(o)	5	5	gltH	5	+		2 C, ovaires soudés	2 "akènes"	<i>Apium</i>
double ombelle	o-(o)	5	5	gltH	5	+		2 C, ovaires soudés	2 "akènes"	<i>Sium</i>
double ombelle	o-(o)	5	5	gltH	5	+		2 C, ovaires soudés	2 "akènes"	<i>Oenanthe</i>
(grappe pyramid.)	o	5lobes	5lobes	H	5	.	©	4-5C soudés	sec, n graines	<i>Hottonia</i>
(grappe pyramid.)	o	5lobes	5lobes	H	5	.	par.	2 stigmates, n ovules	capsule	<i>Menyanthes</i>
par 2-5, pédicelle	o	5lobes	5lobes	H	5	.	par.		capsule à n graines	<i>Nymphoides</i>
Glt 1, sessile ou péd.		absent		M	1	.		2 C, ovaires soudés	4 "akènes"	<i>Callitriche</i>
grappe cylindrique	·l	4lobes	4lobes	H	2	.	ax.	2 C soudés, 2 loges	capsule à n graines	<i>Veronica</i>
1 ou grappe	·l	2lèvres	2lèvres	H	2	.	©	2 stigmates	capsule à n graines	<i>Utricularia</i>
1 ou épi	·l	4 + 4		M	4	.		2 C, 1stigmate	akène	<i>Littorella</i>
grappe pyramid.	o	3	3	M	>=7	.		nC libres spiralés	akènes	<i>Sagittaria</i>
panicule pyramid.	o	3	3	H	6	.		nC libres	akènes	<i>Alisma s.s.</i>
omb.ou 2 verticil.	o	3	3	H	6	.		nC libres spiralés	akènes	<i>Baldellia</i>
glt 1	o	3	3	H	6	.		nC libres	akènes	<i>Luronium</i>
ombelle	o	3	3	H	6	.		nC base connée	follicules	<i>Damasonium</i>
gr.-panic.pyramid.	o	3	3	HM	glt6-12	.		nC libres	akènes +- charnus	<i>Caldesia</i>
ombelle	o	3	3	H	9	.		9C ± libres	(follicules)	<i>Butomus</i>
fleurs fem. 1	o	3	3	D(M)	2-12	+	par.	3-6 stigmates	±charnu aquatique	<i>Hydrocharis</i>
fleurs fem. 1	o	3	3	M	12	+	par.	6 styles	capsule	<i>Stratiotes</i>
1	o	3	3(<=S)	D	9	+	par.	3 styles	capsule	<i>Elodea</i>
1, males par 2-4	o	3	3(>>S)	D	9	+	par.	3 styles	capsule	<i>Egeria</i>
1, males nombreuses	o	3	3	D	9	+	par.	3 styles	capsule	<i>Lagarosiphon</i>
fleurs fem. 1	o	3	+0(-1)	M	2-3	+	par.	3 styles	capsule	<i>Vallisneria</i>
	(·l)		1-3	±H		.		3-6C±libres	sec, 1-4graines/C	<i>(Aponogeton)</i>
épi	o	4		H	4	.		4C libres	akènes	<i>Potamogeton</i>
épi, péd.accroissant		absent		H	2	.		4C libres	akènes très stipités	<i>Ruppia</i>
1 ou cîme, subsessile		mâle0,fem.coupe		M	1-2	.		2-6 C libres	akènes stipités	<i>Zannichellia</i>
péd.		3 dents		M	1-3	.		3 C	akènes stipités	<i>Aithenia</i>
1 subsessile		± absent		MD	1	.		2-3 styles	1 akène	<i>Najas</i>
anthèle (de glomérules)	o	3+3		H	3-6	.	ax.-par.	3C, 1-3 loges 3stigm.	capsule à n graines	<i>Juncus</i>
pyramidale	·l	épillat original peu fl.		H	2-3	.		2-3 styles-stigmates	1 akène	<i>Catabrosa</i>
pyramidale	·l	épillat original n fl.		H	2-3	.		2-3 styles-stigmates	1 akène	<i>Glyceria</i>
pyramidale	·l	épillat original 1 fl.		H	2-3	.		2-3 styles-stigmates	1 akène	<i>Agrostis</i>
pyramidale	·l	épillat original 2 fl.		H	2-3	.		2-3 styles-stigmates	1 akène	<i>Antinoria agrostidea</i>
cylindrique	·l	épillat original 1 fl.		H	2-3	.		2-3 styles-stigmates	1 akène	<i>Alopecurus aequalis</i>
1 épillat	·l	épillat original n fl.		H	3	.		2-3 stigmates	1 akène	<i>Scirpus Eleogiton fluitans</i>
(anthèle de) glomérules	·l	épillat original n fl.		H	1-3	.		2-3 stigmates	1 akène	<i>Scirpus Schoenoplectus</i>
1 épillat	·l	épillat original n fl.		H	3?	.		2-3 stigmates	1 akène	<i>Eleocharis</i>
capitules sphériques	o	1-6	0	M	glt 3	.		1-3 C ? 1stigmate	(1 akène)	<i>Sparganium</i>
1 épi,mâle en haut		soies		M	2-5	.		1stigmate plat	± 1 (akène)	<i>Typha</i>
1		absent		M	1-2	.		1stigmate, 1-7 ovules	(fruit rare)	<i>Lemnaceae</i>

Daniel Chicouène

**Retour page d'accueil 'plantouz' :** <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/>>