



# Graminées vs. Cypéracées

(déc.2013, Daniel Chicouène)


**Plan de cette page :** Comparaison des épillets  
Détermination par les inflorescences pour le Massif Armoricain

Extrait de Chicouène 1998, in ERICA



	<i>Gramineae</i>	<i>Cyperaceae</i>
fleurs supérieures avortées	0-n	(0-)n
fleurs au moins en partie fertiles	1-n	(1-)n
gynécée	0 ou avec styles << stigm	0 ou avec 1 style ≈ stigmates
androcée	0, 2-3(-6) étamines	0, 2-3(-6) étamines
périanthe	0, 2(-3) lodicules	0, 0-n arêtes
préfeuille de l'axe floral (± en t	+ (palea) ou -	- ou + (utricule)
bractée florale (plus ou moins d	lemma (plurinervée)	glume fertile (uninervée)
bractées basales stériles (pas de bourgeon axillaire) (plus ou moins cucullées)	0, (1-)2(-3) glumes ou 2 glumes + 1-3 lemma st	0-n glumes stériles (ou 1 bractée d'inflorescence)

*Fig. 1 : comparaison des épillets de Gramineae et de Cyperaceae*



a) long

b) moyen

c) court

Fig. 2 : exemples de longueur des entre-noeuds de la rachéole

guide de détermination

des *Gramineae* et *Cyperaceae* armoricaines

utilisant en priorité la silhouette d'inflorescence

extrait de CHICOUENE (1998) modifié

silhouette	<i>Gramineae</i>	<i>Cyperaceae</i>
épillet solitaire	fleurs distiques	fleurs spiralées
1 capitule	(chaume à plusieurs entre-noeuds)	(chaume à 1 seul entre-noeud)
cylindrique et pyramidale	insersion distique ou radiaire sur l'axe principal	insersion tristique (et épillets spiralés)
corymbiforme	fleurs distiques	fleurs spiralées
ombelliforme	possible	absente
anthéliforme	absente	possible

Daniel Chicouène

Retour page d'accueil 'plantouz' : <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/>>