

Vues de rachéoles avant l'anthèse pour 6 taxa d'*Avena*.

(Daniel Chicouène, 'dc.plantouz', dernière mise à jour nov. 2020)

Plan de ce fichier :	p. :	à jour :
introduction-résumé	1	nov.2020
Photo 1 : vue générale des 6 taxons	"	"
Espèces uniquement sauvages :	2	"
inflorescence <i>A. fatua</i> + <i>A. ludov.</i>	"	juil2021
2 : <i>A. ludoviciana</i> , <i>A. fatua</i>	3	nov.2020
3 : <i>A. ludoviciana</i>	3	"
4 : <i>A. barbata</i>	"	"
Espèces cultivées :	4	"
5. <i>A. sativa</i> ; <i>A. nuda</i>		
6. <i>A. strigosa</i>		

Introduction-Résumé.

Comparaison de 6 espèces du genre *Avena* (*Gramineae Pooideae*), sauvages ou cultivées dans le Massif Armoricaïn par des photos d'épillet, rachéoles et fleurs avant l'anthèse. Les glumes sont dégagées ou arrachées afin de mieux visualiser les jeunes rachéoles : longueur, diamètre et forme des entre-noeuds, emplacement luisant et glabre de chaque future zone d'abscission des espèces uniquement sauvages (allongé, trapu et uniquement sous la fleur inférieure pour *Avena ludoviciana*, sous chaque fleur pour *Avena fatua* (et arrondi) et *Avena barbata* (long et étroit).

(Remerciements à Pierre Danet pour les clichés)

Littérature.

CHICOUENE D. 2013 - Contribution à la morphologie comparée des avoines à fleurs mûres caduques (*Avena fatua*, *A. ludoviciana*, *A. sterilis*, *A. barbata*) : observations en Anjou et environs. [Contribution to the comparative morphology of **oats** with deciduous spikelets (*Avena fatua*, *A. ludoviciana*, *A. sterilis*, *A. barbata*) : observations from the Anjou region and surrounding areas.] *Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou* n.s. XXVI : 97-132 [2 tab., 3 fig., 1 annexe]. **article** <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/SESA2013AvenaDChicouene.pdf>>

CHICOUENE D. 2016 - Morphologie des 7 *Avena* des Pays de Loire ou du Massif Armoricaïn. Pour Conservatoire Botanique National de Brest région Pays-de-Loire le 5 mars 2016 à Ancenis, 8 p. <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/REU_PDL/Avena_chicouene.pdf>
Erratum : p.3 schéma 1 : remplacer "photo 5" par "photo 6".

RESULTATS-PHOTOS.






base d'épillets: *A. fatua* plutôt étroit-cônique; échelle; *A. ludoviciana* plutôt large-arrondi



Avena ludoviciana (légende + détails en tab. en dessous) ; *Avena fatua* (1er épillet : rachéole entre F1 et F2 cassée ; au milieu : fleuron tombé)



Avena ludoviciana. Détail dont les 2 premiers épillets à rachéole coupée entre F1 et F2 ; les 2 à droite entiers.



Avena barbata. Les 2 premiers épillets à rachéole coupée entre F1 et F2.

ESPECES CULTIVEES :



Avena sativa : cultivar foncé après anthèse ; Avena nuda : cultivar clair avant anthèse



Avena strigosa : 3 épillets



base des 3 épillets



Comparaison de 3 types de [cartes noeuds-liens possibles](#) est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](#).

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à daniel.chicouene@orange.fr.

Daniel Chicouène

Retour page d'accueil 'plantouz' : [<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/>](http://dc.plantouz.chez-alice.fr/)