

**Papilionaceae** :

(dernière mise à jour juin 2017, Daniel Chicouène, dc.plantouz)

<u>Plan de cette page :</u>	<u>p.</u>	<u>à jour :</u>
Genista	2	2015
Ulex	3	"
Melilotus	5	"
Ononis		"
Trifolium subgen.	6	"
-strictum/glomeratum/suffocat.	7	"
-striatum/scabrum	"	"
-repens/occidentale	8	mai2016
-fragiferum/resupinatum	9	2015
-jaunes : groupes	10	"
-dubium/micranthum	"	"
-campestre/patens	11	"
Medicago	12	"
Medicago gr.sativa	"	"
Lotus groupes	13	2015
-L.annuels	"	"
-L.pérennes	14	"
Vicia groupes	15	"
-V.lutea/sativa/lathyroides	"	"
-V.hirsuta/tetrasperma/tenuiss.	16	juin 2017
-V.Cracca	17	2015
Lathyrus groupes	"	"
Lathyrus sp.	18	"
Pisum arvense / tuffetii	"	"
Ornithopus	19	"

<u>PAPILIONACEAE</u>	
<i>Robineae</i>	30 Robinia
<i>Phaseoleae</i>	Phaseolus Vigna Glycine
<i>Galegeae</i>	32 Galega Colutea 38 Astragalus
<i>Hedysareae</i>	Onobrychis
<i>Loteae</i>	Anthyllis Lotus Tetragonolobus
<i>Coronilleae</i>	Ornithopus Coronilla Hippocrepis Securigera (Coronilla v
<i>Fabeae</i>	49 Vicia 50 Lens 51 Lathyrus 52 Pisum
<i>Cicereae</i>	Cicer
<i>Trifolieae</i>	53 Ononis 54 Melilotus 55 Trigonella 56 Medicago 57 Trifolium
<i>Genisteae</i>	Lupinus Laburnum 12 Cytisus Spartium 16 Genista 24 Ulex 26 Adenocarpus

<b>Genista</b>	<b>Genista anglica</b>	<b>Genista tinctoria</b>	<b>Genista pilosa</b>
bio			varie à longs rameaux redressés, ou à tiges courtes tout à fait apprimées sur la terre (Bor) ; [marcotte abondamment à Huelgoat]
épines	chargé (LeG) ; glt épineux (Sta)	non épineux (LeG) ; jamais (Sta)	non, tiges tuberculeuses (Bor)
pilosité	entièrement glabre (LeG)	rameaux à peine pubescents au sommet ; feuilles glabres ou seulement pubescentes sur les bords (LeG)	rameaux couverts, comme c toute la plante, de poils courts soyeux apprimés (Bor)
étendard	< autres P (LeG)	c.= carène (LeG)	
gousse	oblongue, renflée (LeG) ; cylindrique... (Bor)	allongée, comprimée, pointue (LeG) ; glabre (Bor)	poils ... (Bor)
habitat	lande humide	prairies, lisières forestières, surtout sols neutre	landes, lisières forestières oligotrophes

<b><i>Ulex</i></b> "examiner plusieurs fleurs" Le Gall (1852) : 130	<b><i>Ulex europaeus</i></b>	<b><i>Ulex gallii</i></b> ( <i>Ulex provincialis</i> LeGall in LI)	<b><i>Ulex minor,</i></b> <b><i>Ulex nanus</i></b>
hauteur	1-2 m (Corb) ; Jq 2(-3) m	4-7 dm (LeG) ; 5-15 dm (Corb) ; 1 1/2 (- 2) m ;	3-7 dm (Corb) ; 1 (-1 1/2) m
couleur (Corb)		vert à peine glauque	non glauque
port	arbrisseau droit (LeG) ; dressé (Corb)	c. id. (LeG) ; dense (Corb)	rameaux tombants ou même couchés (LeG) ; très diffus, souvent couché (Corb)
rameaux pilosité (LeG)	plus ou moins velus		velus
feuille : / épine au bout	contractée en épine au sommet (SM)		atténuée à la base (SM)
épines longueur	longues (LeG) ; 2 cm au dessous de l'infl. (Corb) ; c. 2cm...(FVMA)	c. 15 mm (Corb) ; - 1.5-4 cm (FVMA)	assez courtes (LeG) ; 1 cm (Corb FVMA)
épines forme	droites (FVMA)	souvent arquées vers le sol (Corb) ; arquées (FVMA)	droites ou c. (FVMA)
épines diamètre	fortes (LeG) ; dard rigide très prédominant (Corb)	c. fortes (LeG) ; dard terminal très prédominant, c. aussi vulnérant (Corb)	un peu grêles (LeG) ; grêle (Corb)
épines sillonnées (FVMA Sta)	profondément	faiblement ou simplement striées (FVMA) ; modérément	peu
épines densité	espacées (FVMA)	Interm. (FVMA)	très rapprochées (Corb) ; recouvrant c. rameaux (FVMA)
feuilles (LeG)	très petites, lancéolées- linéaires, d'abord velues ou pubescentes, puis glabres	c. id.	bien poilues
inflorescences (LeG)	fleurs solitaires ou gemminées	-	-
bractéoles : orientation, forme, pilosité	lâches, ovales (Ferr) ; lâches, ovales, tomentueuses (LeG) ; courtement ovales (Corb)	appliquées, un peu larges, courtes, pubescentes (LeG) ; ovales aigues ou ovales (Corb)	appliquées, étroites (Ferr) ; appliquées, étroites, peu visibles (LeG) ; très étroites (Corb)
bractéoles : largeur / pédicelle	> (Corb FVMA) ; > ou = 2 fois (Sta)	c. égal (Corb FVMA) ; < ou = à 2 fois (Sta)	< (Corb FVMA) ; < ou = à 2 fois (Sta)
bractéoles dimensions	1.8-4.5 x 1.5-4 mm (Sta)	0.5-0.8 x 0.6-0.8 mm (Sta)	0.6-0.8 - 0.4-0.6 mm (Sta)
bractéoles largeur	2-7 mm (FE)	c. 0.75 mm (FE)	c. 0.5 mm (FE)
S longueur (c. FE)	(1-)1 1/2 (-2) cm	1 cm	1/2 - 1 cm
S poils	étalés dressés (Corb) ; + étalés (FE)	courts, appliqués, parfois un peu étalés-dressés surtout vers la base (Corb) ; appliqués (FE)	très fins, apprimés (Corb) ; appliqués (FE)
S pilosité densité	tomentueux (LeG) ; très velu (Corb SM FVMA)	pubescent (LeG Corb)	presque glabre (LeG) ; glabrescent, couvert (Corb) ; légèrement pubescents (SM)
S divisions (LeG)	fort petites et conniventes	manifestement dentées au sommet	bien écartées
S port des dents (origine ?)	convergentes	l'inf. parallèle ou convergente	l'inf. divergente
P couleur	beau jaune (Ferr Corb) ;	jaune orangé (LeG) ; beau	jaune pale (Ferr LeG) ;

	jaune pur et brillant(LeG); jaune pale (FE)	jaune orangé (Corb) ; jaune d'or foncé (FE)	jaune pale (citron) (Corb) ; jaune clair (FE)
étendard longueur	12-18 mm (Sta) ; (P1.5- 2cm FE)	(12)13-18(22) mm (Sta)	7-12(13) mm (Sta)
fleur longueur	grandes, 15 mm (Corb) ; > ou = 1.5 cm (FVMA)	12-13 mm (Corb) ; c.1.2 cm (FVMA)	petites, 7-9 mm (Corb) ; 0.8-1 cm (FVMA)
étendard / S	beaucoup plus long (Ferr LeG)	un peu plus long (LeG)	un peu plus long (Ferr LeG)
étendard : sommet	échancré (SM)		bifide (SM)
ailles / carène	> (Ferr LeG) ; >, se recouvrant à l'extrémité (Corb) ; dépassant un peu et se recouvrant à leur extrémité (FVMA) ; > (FE)	= (LeG FVMA) ; > (Bréb.) ; variable (Corb) ; ailles et carène glt un peu > S(FE)	< (Ferr LeG, Bréb.,Corb LI) ; < et moins large (GG) ; 1 peu plus courtes (FVMA) ; = carène = S (FE)
ailles forme	courbées au sommet (LeG) ; arquées (Corb) ; droites (FE)		
carène (GG)	droite		courbée
fruit longueur	1.1-2 cm (FE) ; (12)14-17(19) mm (Sta)	8-11 mm (LeG) ; (8)9-13(14) mm (Sta)	c. 8 mm (FE) ; 6-8.5 mm (Sta)
fruit largeur (Corb)	6-7 mm	5 mm	4 mm
fruit / S	dépasse un peu (Ferr LeG) ; > (SM Corb)	excede à peine (LeG) ; c. = (Corb) ; un peu sup ou = (LI)	n'excede pas S (Ferr LeG) ; < (Corb) ; = (SM)
fruit forme	oblong (Ferr LeG)	ovoïde-oblong* (LeG)	presque ovoïde (Ferr) ; ovoïde-oblong (LeG)
fruit pilosité	velu-hispide (Ferr) ; velu (LeG) ; très velu même à maturité (Corb) ; densément villeux (FE)	velu-hispide (LeG) ; velu (Corb)	velu-hispide (LeG) ; velu (Corb) ; villeux (FE)
ovules nb/carpelle (Sta)	(8)9-14(16)	(3)4-6(7)	Id.
graines / fruit (FVMA)	4-6	Glt 6	Glt 4
graine : forme (GG, SM)	échancrée		non échancrée
graines ombilic (SM)	ovale		orbiculaire
anthèse	fin aut., hiver, printemps (LeG) ; Déc-juin (LI) ; Hiver-printemps (Sta)	sept-déc. (LeG) ; Aout-déc (LI) ; Surtout été (Sta)	aout-oct. (LeG) ; Juil-oct (LI) ; Surtout été (Sta)
déhiscence fruit saison	été (Sta)	printemps (Sta)	printemps (Sta)
habitat	terrains en friche, talus, landes (LeG); sol neutre à peu acide(FE)	landes du littoral... (LeG) ; Calcifuge (FE)	lieux stériles, landes (LeG)

*gallii* : fruits larges de 4-6 mm, pas exactement ovoïde-oblong, suture ventrale courbée brusquement près du sommet = un peu rhomboïdale ; maturation lente (LeG).

Des intermédiaires :

-*europaeus* x *gallii* = *Ulex* x *breogani*, variable et très fertile (Sta) [fleurit surtout en mai à la fin de *europaeus*]

-*gallii* x *minor* (Sta)

<b>Melilotus</b>	<b><i>alba</i> (Bor FVMA FE) <i>albus</i> (Sta)</b>	<b><i>altissima</i> (Bor FVMA FE) <i>altissimus</i> (Sta)</b>	<b><i>officinalis</i> (FVMA FE Sta) <i>arvensis</i> (Bor SM)</b>	<b><i>indica</i> (FVMA FE) <i>indicus</i> (Sta) <i>parviflora</i> (Bor)</b>
hauteur	1 m (cBor Sta)	1-2m (Bor)	1/2m (Bor), 1m (Sta)	1-4 dm (Bor cSta)
grappe	très allongée (Bor) ; lache (FE)	lache (Bor) 2-5 cm, s'allongeant en fruit (FE)	lache (Bor FE)	serrée, dépasse feuilles (Bor) ; dense (FE)
fleur : dimension	4-5mm (Sta)	5-6mm (FVMA)	5-6mm (FVMA)	petite (Bor) 2-3mm (FVMA) ; 2-3,5mm (Sta)
fleur : odeur	inodore (FVMA)	odorant (Bor FVMA)	très (Bor) odorant (FVMA)	
P : clr	<u>blanc</u> (Bor...)	beau jaune (Bor)	jaune clair (Bor)	jaunatre (Bor)
aile / carene	c= (Bor Sta)	c= (Bor Sta)	> (Bor Sta)	c= (Sta)
fruit	3-5mm (Sta)	5-7mm (Sta)	3-5mm (Sta)	<u>2 mm</u> (FVMA)
fruit : poils	glabre (Sta)	<u>pubescent</u> (Bor) ; appliqués (FVMA cSta)	glabre (FVMA Sta)	glabre (Sta)
fruit : graines	1 (Bor) ; 1-2 (SM)	surtout 2 (Bor Sta) ; 1-2 (SM)	1 (Bor) ; 1-2 (SM) ; surtout 1 (Sta)	1 (Bor)
graine	lisse (SM)	ponctuée (Bor SM)	lisse (Bor SM)	granuleuse (Bor)
anthèse	juil-aout (Bor)	juil-sept. (Bor)	juin-sept (Bor)	juin-juil (Bor)
habitat	surtout Ca	hygrophile (cBor)	surtout Ca (cBor)	champs (cBor)

<b><i>Ononis</i></b>	<b><i>Ononis repens</i></b>	<b><i>Ononis spinosa</i></b>
bio	rhizome (Sta)	racine pivotante (Sta)
rameaux : épines	spinescent (LeG)	glt bien spinescent (LeG)
tige : poils	tout autour (Sta)	1 ou 2 rangs (opposés) (Sta)
folioles : allongement	< 3 x (larges) (Sta)	> 3 x (étroits) (Sta)
folioles : apex	obtus à émarginé (Sta)	aigu à subaigu (Sta)
fruit / S	plus court (LeG)	dépasse un peu (LeG)
fruit : longueur	5-8 mm (Sta)	6-10 mm (Sta)
fruit : nb graines	2 (LeG)	3 (LeG)

<b>Trifolium</b> (subgen et sect. sec. FE)	bio	infl	bractéoles	pédicelle	calice poils	calice gorge	P (sauf indication contraire : blanc ou +/- roug.)	fruit / S
Falcatula (Trigonella) ornithopodioides	an		oui			ouverte, anneau de poils ou callosité		>> <b>S</b>
Lotoidea Paramesus : strictum	an		+ - soudées	oui	glabre ou c.	ouverte, sans poils		peu >, coriace
Lotoidea Lotoidea : gr repens, hybridum, michelianum, glomeratum, suffocatum	an, per pivot ou st	ombelle glt [épi ou grappe]	membraneuses lancéolées	var.	glabre ou c.	ouverte, sans poils		> sauf glomeratum
Trifolium Trifolium : pratense, medium, rubens, angustifolium, ochroleucon, stellatum, incarnatum, striatum, bocconeii, scabrum, arvense, angustifolium, maritimum, alexandrinum	an, per pivot ou rh	glt <b>épi</b>	nulles		au - dents velues	glt +- fermé à anneau de poils		glt <
Chronosenum : patens, campestre, dubium, micranthum	an	ombelle [grappe]	en qq poils (rougeâtres)? [réduites]	oui	.	ouverte et glabre, 5 nerv.	<b>jaune</b>	stipité, peu >
Vesicastrum : fragiferum, resupinatum	an, per st	ombelle?	libres ou soudées		glt +	cylindrique, 10 nerv., <b>renflé en</b> <u>fruit</u> (2 dents sup accrescent)		<
Trifolium Trichocephalum : subterraneum	an	capitu. à fl int. en <u>calices</u> <u>stériles</u> accrochant à maturité	nulles		au - dents velues	nue, renflé en fruits		peu >

<i>Trifolium</i> +- glabre dt S, bractéole +	<i>Trifolium strictum</i>	<i>Trifolium glomeratum</i>	<i>Trifolium suffocatum</i>
hauteur	1-3 dm	1-2 dm	1/2 dm
port	dressé ou ascendant (SM)	étalé ou dressé (SM)	couché (SM)
stipules : forme	grandes, ovales, obtuses ou aigues, longuement soudées en tube évasé au sommet, <b>dentées</b> -glanduleuses, nerviées (SM) ; serrées (Sta)	scarieuses, entières, ovales, acuminées (SM)	ovales, brusquement acuminées (SM)
pédoncule	sillonné, > <b>F</b> (SM)	sessile et subsessile (SM)	sessile, rapproché, cachant presque la tige (SM)
pedicelle	sessile (cle FVMA) ; pédicelle (FE)	sessile (FE) [presque]	sessile (FE)
calice : dents		réfractées après l'anthèse (SM)	courbée en dehors (SM)
calice fructifère	un peu renflé (Sta)		
corolle / calice	> (SM)	> (FVMA)	< (SM FVMA)

<i>Trifolium</i> velus dt S, sans bractéoles, infl. sessile	<i>Trifolium striatum</i>	<i>Trifolium scabrum</i>
tiges		flexueuses (SM)
stipules	les sup dilatées (SM)	non dilatées (SM)
capitule à sa base	munis de feuilles florales (SM)	dépourvus de feuille florale (SM)
calice	ovoïde subglobuleux après floraison (SM)	subcylindrique (SM)
dents du calice	dressées, peu inégales (SM) ; dressées-étalées à maturité (FVMA)	inégales, raides et recourbées (SM)
P : couleur	rougeatre (SM)	blanchatre (SM)
graine	globuleuse (SM)	ovoïde (SM)

+ *bocconeii* : infl. glt par 2, S en épine

<b><i>Trifolium</i></b> que stolons, infl. acrotonie (pédicelles > 5x les inf)	<b><i>Trifolium repens</i></b>	<b><i>Trifolium occidentale</i> Coombe*</b> (FE Sta3) ; <b><i>Trifolium repens f. maritimum</i> (Corb)</b>
vigueur de la plante		tige plus courte que la plupart des <i>repens</i> (Coombe)
folioles : dimensions		folioles petites, larges de 4-5mm (Corb) ; dépassent rmt 10 x 10 mm (Coombe)
folioles : taches	svt marques avec un V blanc (PICr) ; svt taches claires ou foncées (FE Sta3)	absentes (Coombe FE Sta3) ; glt absentes (PICr)
folioles : couleur	les 2 faces id. (PICr) ; marges claire ou foncé (FE Sta3)	vert foncé et glauque, marge étroitement hyaline (Coombe) ; face sup mate, légèrement glauque, cristalline, face inf vert foncé, très brillant (PICr)
folioles : nervures latérales	translucides sur le frais (FE PICr Sta) [d'un bout à l'autre]	non translucides sur le frais (Coombe, cle FE Sta3) [parfois translucides dans leur mi sup ?]
folioles : épaisseur	mince	plus épais que la plupart des <i>repens</i> (Coombe) ; plus épais (FE Sta)
poils : pétioles, pédoncules	plante glabre ou glabrescente (FE) ; glt glabre (PICr) ; glabre (Sta) ; [pédoncules svt velus?]	pétioles pubescents (Corb) ; surtout vers l'anthèse (moins en hiver), persistants, incolores, jq 1 mm, pétioles et pétiolules (Coombe) ; poils courts, épars, persistants (PICr)
fleurs par tete		moins que la plupart des <i>repens</i> ...20-40 (Coombe)
calice : lobes	calice à lobes triangulaires lancéolés (Sta) ; narrowly lanceolate (cle FE)	ovate-lanceolate ou triangulaire (cle FE) ; triangulaires ovales (Sta) ; [plus courts que <i>repens</i> ]
calice : 2 lobes sup.		1,5-2 mm, ovale-lanceolé à triangulaire, parallèles ou convergent ou recourbés, svt 1-2 dents surtout sur la marge sup. (Coombe)
[calice : dents sup. longueur]	c. (2-)3 mm ; IL : c3	2 mm ; IL 1 1/2-2
fleur : odeur	odorante (FE)	inodore (Coombe FE Sta3)
corolle : dimensions	8-13mm (FE)	8-9mm (FE)
P : couleur (FVMA) caractère à confirmer	blanc à rouge (PICr) ; blanc, parfois un peu rosé	blanc (Corb) ; blanc crème, jamais rosé (Coombe)
étendard : forme (apex...)	oblong, apex arrondi (PICr) ; arrondi (Sta) ; [svt denticulé]	largement elliptique, apex émarginé (Coombe)
anthèse	mai-sept.	plus précoce, fin mars à début juil. (Coombe)

\*COOMBE D.E. 1961 - *Trifolium occidentale*, a new species related to *T. repens* L. *Watsonia* 5 : 68-88.  
+1967 - Further observations on *Trifolium occidentale*. *Watsonia* 6 : 271-275 [pour Massif Armoricain].

Des intermédiaires entre ces 2 descriptions peut-être dus à une prise en compte insuffisante de la variabilité des 2. Ex. *occidentale* à nervures translucides dans leur moitié sup, à étendard non échancré ; *repens* à pétioles bien velus, à dents sup de S à pointes convergentes. COOMBE p.70 "diffère de *repens* dans une combinaison de caractères relativement constante, certains existants dans des population ou individus de *repens*" : c'est bizarre.



<b><i>Vesicarium</i> calice velu, se renflant, réticulé</b>	<b><i>Trifolium fragiferum</i></b>	<b><i>Trifolium resupinatum</i></b>
bio	vivace, tiges rampantes (LeG) et s'enracinant svt (FE)	annuel (LeG FE)
hauteur	petit ou assez petit (LeG) ; 1 dm - 1/4 m (cFE)	moyen ou qqfois petit (LeG) ; 1 dm - 1/2 m (cFE)
<u>pilosité</u>	tige var., pétiole poilu, foliole glabre ou c (LeG) ; +- velu (FE)	glabre (LeG FE)
pétiole	long (LeG)	glt médiocre (LeG)
foliole : apex	faiblement échancré (LeG)	- (LeG)
stipules	membraneuses, lancéolé-subulé, entier (LeG)	demi-membraneuses, lancéolé-entier (LeG)
pédoncule	très long et assez fort (LeG)	médiocre et fin (LeG) [1 cm x 3/4 mm]
bractéoles	3-4mm, verticillées, les inf à base soudée (FE)	minuscules, à base soudée (FE) [1/2 mm échancrées]
capitule	involucre (LeG)	- (LeG)
capitule mur	bien globuleux, prenant un peu l'apparence d'une fraise (LeG)	globuleux anguleux (LeG)
calice jeune : dents	subulées, c. = (LeG)	inégales, 2 très subulées, 3 lancéolées-acérées (LeG)
calice fructifère	obovoïde, seulement bidenté (LeG)	ovoïde-conique, fendu dans toute sa longueur, à 2 dents courbées (LeG)
corolle / calice	double du jeune calice (LeG)	[id]
corolle	rosée, double du jeune calice (LeG)	purpurine, <u>renversée</u> (LeG) ; <u>résupinée</u> (FE...)
gousse	ovoïde-comprimée (LeG)	ovoïde-globuleux (LeG)

<i>Trifolium</i> jaunes	gr. <i>dubium-micranthum</i>	gr. <i>campestre</i>
stipules	var. (cSM)	dilatées et arrondies à la base [éperon] (FE)
étendard : port	plié en carène (FVMA)	déployé (FVMA) ; caréné sur le dos, infléchi après l'anthèse (SM)
étendard / ailes	dépasse à peine (SM)	dépasse (SM)
étendard : surface	lisse [ou peu strié]	strié (SM...)
ailes	porrigées (SM) ; non divergentes (FVMA)	divergentes (SM FVMA)

<i>Trifolium</i> jaune pp	<i>Trifolium dubium</i> ( <i>filiforme auct.</i> )	<i>Trifolium micranthum</i> ( <i>filiforme L. nom amb.</i> )
tige (FVMA, FE)	pubescente (SM)	glabre (SM) ; glabrescente (FE)
stipules : forme	ovales aiguës, <u>élargies et arrondies</u> à la base du coté externe (SM)	ovales ou oblongues, aiguës <u>non dilatées</u> à la base (SM)
stipules / pétiole	> ou = (SM)	> (SM) [svt 2 fois]
feuille : foliole médiane [bof]	bien pétiolulé (LeG) ; glt pétiolulées (SM) (plus longuement que les folioles latérales)	c.sessile (LeG) ; tjs sessile (SM) ; subsessile (FE)
foliole	1 cm (FE)	1/2 cm (5-8 mm) (FE)
pédoncule : forme	droit, raide (SM) ; non capillaire (FE)	capillaire, <u>flexueux</u> (SM) ; capillaire (FE)
pédoncule / feuille	> (SM)	> ou = (SM)
têtes fleurs	8-9 mm (FE)	4 mm (FE)
têtes : nb fleurs	5-15 (SM) ; (6)10-15(20) (FVMA)	2-6 (SM)
<u>pédicelle / tube S</u>	<< (SM) ; < (FE)	> ou = (SM FE) ; fructifère 1-1.5x le lobe sup du tube du calice (?)
pédicelle : longueur	1 mm (Sta) [1/2 mm]	fructifère 1-1.5x le lobe sup du tube du calice (?) ; 1 1/2 mm (c.Sta) [3/4-1 mm]
<u>pédicelle : diametre</u>	gros (SM) [ <b>trapus</b> , 1/4-1/3 mm, papilleux]	fins (SM) ; <b>capillaire</b> (FE) [0,1 mm]
<u>pédicelle : IL</u>	[2-3fois]	[c 5 fois]
capitule : nb fleurs	20-30 (LeG) ; 5-15 fleurs (-25 ; FE)	1-6 fleurs (FE)
S : dents (dessins in Rothmaler)	très inégales (SM GG) ; les inf = limbe inf du tube (FE) ; [les courtes = 1/4 des longues]	inégales (SM GG) ; les inf > limbe inf du tube (FE) ; [les courtes = 3/4-1/2 des longues]
S à l'anthèse : clr	[jaunatre]	[verdatre]
P : couleur	jaune pâle puis brunissant (SM); jaune brunissant après anthèse (FE)	jaune puis palissant (SM) ; jaune brunissant après anthèse (FE) olim ???
P étendard	c. lisse (SM)	lisse (SM)
gousse mure	encore couverte par l'étendard (LeG)	
gousse : couleur	brun clair (SM)	brun (SM)
graine : couleur	jaune brun (SM)	roux (SM)
graine : forme	ovoïde renflée (SM)	ovoïde (SM)

des intermédiaires probables ?

<b>Trifolium jaune pp</b>	<b>Trifolium campestre (in FE...)</b> (= <i>procumbens</i> + <i>pseudoprocumbens</i> in SM ; <i>procumbens</i> var. <i>campestre</i> in LeG)	<b>Trifolium patens*</b>
foliole impaire	longuement pétiolulée (SM)	sessile ou pétiolulée (SM)
folioles : forme	obcordiforme ou obovale (LeG)	ovale-oblong ou seulement oblong (LeG)
folioles : marge	finement denté (LeG)	denté dans leur partie sup. (LeG)
stipules	élargies et arrondies à la base du coté externe (SM) ; entières (FVMA)	dentées au coté externe et auriculées à la base (SM) ; dentées vers le sommet (FVMA) ; base svt auriculée (cle FE) ; [dents sur mi sup ext., de c. 1/4 mm]
<b>pédoncule / feuille</b>	< ou à peine > : proc. ; > : <i>pseudoprocumbens</i> (SM) ; [1/2 - 2(3) fois selon les individus]	>> (SM) ; [c.3 fois]
capitule : forme	ovoïde (LeG) ; ovoïde, de 10-12 mm de diamètre (SM) (5-6 mm = <i>pseudoprocumbens</i> in SM)	assez lache, hémisphérique (LeG) ; assez lache, hémisphérique pendant l'anthèse (SM)
pédicelle	gros (SM)	-
S : dents	très inégales (LeG)	
S : dents sup / tube	< (SM)	c. = (SM)
S : dents inf.	subulées (SM) ; [c. = tube]	linéaires (SM) [bof, triangle étroit ; c.2 fois le tube]
<b>P : couleur à l'anthèse</b>	jaune mat ou pale (LeG) ; jaune pale (SM)	jaune d'or (LeG) ; jaune vif (SM)
<b>étendard : forme</b>	bien strié (LeG) et sommet courbé ; infléchi après l'anthèse (SM) ; concave (FVMA) ; [1/4 sup presque genouillé, vers le bas]	médiocrement strié (LeG) ; un peu infléchi après l'anthèse (SM) ; [droit]
<b>fruit / style</b>	style court (SM) ; 3-6 x style (cle FE)	style long (LeG) ; égal presque le fruit (SM FVMA) ; peu > style (cle FE)
fruit : nb graines	1 ou 2 (LeG)	1 (LeG)
graine	jaune foncé, ovoïde-oblongue (SM) (jaune clair, petite, ovoïde = <i>pseudoprocumbens</i> in SM)	jaunâtre, ovoïde (SM)

\**Trifolium aureum* est proche de *patens* mais stipules à base non dilatée-auriculée et corolle jaune d'or plutôt que jaune (in FE) et stipules plus longues que pétiole (Ry) ; mais ce caractère de longueur des stipules/pétiole n'est peut-être pas fiable.

Pour *campestre* sec. FE (sp variable), des auteurs distinguent 2 sous-espèces ou var. (FVMA) ou sp (SM) :

<b>T. campestre (FE)</b>	<i>campestre</i> ; <i>T. procumbens</i> (SM) ; <i>var. majus</i>	<i>T. pseudoprocumbens</i> (SM) ; <i>var. pseudoprocumbens</i> (FVMA)
feuille : pétiole de foliole impaire	longuement pétiolulée (SM)	pétiolulée (SM)
P	jaune clair (SM) ; jaune assez vif (FVMA)	jaune soufre pale (SM) ; jaune très pale (FVMA)
capitule : diamètre	10-12 mm (SM)	5-6mm (SM)
capitule : longueur	1,2 - 1,3 cm (FVMA)	1 cm
capitule : nb fleurs	30-40 (FVMA)	15-20 (FVMA)
pédoncule / feuille	< ou à peine > (SM) ; < ou = (FVMA)	> (SM) ; 2 fois (FVMA)
pédicelle	gros (SM)	-
graine	jaune foncé, ovoïde-oblongue (SM)	jaune clair, ovoïde, petite (SM)
anthèse	mai-oct. (SM)	mai-juin (SM)
habitat	pelouses, bois (SM)	pelouses sèches (SM)

<i>Medicago</i>								L E G U M E					
	biologie port	haut.	poils	folioles tache	grappe nb fl.	corolle dim	nb graines	nb tours	∅	épines *	poils	en+de nerv.marge	
<i>lupulina</i>	an.- pér.vie c.	1-5 dm	± pub.	Δ	10-50	2-3 mm	1	≈1/4 en feu				marge à 1 nerv. longitud.	
<i>orbicularis</i>	an.	2-9 dm	0 ou ≈		1-5	2-5 mm		4-6	1-2 cm		Δ		
<i>gr.sativa</i>	per.	jg 1 m	peu ou pas		5-40	1cm		var				1 nerv. submarginale ou bord large	
<i>rigidula</i>	an.	jg 5 dm	villeuse		1-3	6-7 mm		4-7			Δ		
<i>littoralis</i>	an.	4-10 dm	villeuse épars		1-6	5-6 mm		3-6	4-6 mm	Δ:0 ou jq1/2fr.	0		
<i>arabica maculata</i>	an.	jg 5dm	0-peu	glt foncé	1-4(6)	5-7 mm		4-7 lâche	(4)5-6mm	glt + glt1/2-3/4∅	0		
<i>polymorpha</i>	an.	jg 4 dm	0-pub.		1-5(8)	3-4,5mm		1,5-6	4-8 mm	glt +, > ∅	glt 0		
<i>minima</i>	an.	jg 4 dm	villeuse		1-6(8)	4-4,5mm		3-5	3-5 mm	glt + 0jq>∅	peu villeuse glandul.		
<i>marina</i>	pér. rh.	2-5 dm	toment. blanch.		5-12 ≈capité	6-8 mm		2-3 petit trou	5-7mm	2rangs petit cône	toment. blanch.		

\* dim./légume

<i>Medicago gr. sativa</i>	<i>subsp. sativa (FE Sta3) ; Medicago sativa (Bor)</i>	<i>subsp. varia (Sta3) ; M. media (Bor)</i>	<i>subsp. falcata (FE Sta3) ; Medicago falcata (Bor)</i>
tige : port	dressées dès la base (God)		couchées à la base (God)
folioles poils	glabre (FVMA)		pubescent (Bor, FVMA)
folioles forme	ovales ou oblongues, celles des feuilles sup. plus étroites (FVMA)		feuilles sup. : linéaires (FVMA) ; souvent un peu échancrées (God)
inflorescence	grappe allongée (FVMA), oblongue (God, Bor)		grappe courte (FVMA) subglobuleuse (God)
pédicelle / tube calice	< (God)		> (God)
pédicelle / leur bractée	< (Bor FVMA)	glt < (FVMA)	> (Bor) ; glt > (FVMA)
fleur : couleur	bleu à violet (...)	variable (Bor Sta)	jaune (Bor God FE Sta) ; jaune ou violacé (FVMA)
fleur : dimension	7-11 mm (FE) ; 8-1 mm (Sta)	7-10 mm (Sta)	5-8 mm (FE) ; 6-9 mm (Sta)
gousse : pilosité	pubescente (God)		couverte de poils appliqués (God)
gousse : forme	2-3 tours (Bor) ; 2.5 (God) ; plusieurs tours 2-3 (FVMA) ; 1.5-3.5 (FE) ; 2-3(4) (Sta)	1 tour (Bor) ; 0.5-1.5 (Sta) ; en faucille ou en cercle (FVMA)	en faux et un peu tordue sur elle même (God) ; faux (Bor) ; c. droit ou en faux (FE) ; < 1/2 cercle (Sta) ; à peine courbée en faucille (FVMA)
gousse : forme centre	fermé (Sta)	ouvert (Sta)	ouvert (Sta)
graines	glt 10-20 (Sta)	3-8 ou avortées (Sta)	2-5 (Sta)

Dans FVMA, on peut considérer que *falcata* englobe l'intermédiaire (couleur de la corolle, forme du fruit).

<b>Lotus</b>	annuels	pérennes
pilosité	forte (cSta)	faible ou nulle (cSta)
P	petits, 1/2 - 1 cm	grands, 1 - 1 1/2 cm
fruit : largeur	surtout < 2 mm (Sta)	surtout > 2 mm (Sta)

<b>Lotus</b> annuels, à corolle 1/2-1 cm	<b>Lotus angustissimus (FE), diffusus</b>	<b>Lotus subiflorus (FE) (hispidus auct.) L.hispidus (LeG)</b>	<b>Lotus parviflorus (FE)</b> (proche hispidus in LeG)
stipules		+ larges et + obtuses que L. angustissimus (GG ?)	
pédoncule : nb de fleurs	1-2 (LeG GG) ; 1-3 (FE)	3-5 (LeG) ; 2-4 (GG) ; (1)2-4 FE)	4-6 (GG) ; 3-7 (FE)
dents du calice / tube	< 3 x (FE)	1.5-3 x (FE)	3-4 x (FE)
dents du calice : forme	lancéolées acuminées (GG)	lancéolées acuminées (GG)	linéaires subulées (GG)
corolle / dents du calice	> (FVMA)	> (FVMA)	à peine > (LeG) ; peu < (FVMA)
étendard à dessiccation	garde sa couleur (GG)	devient vert (GG)	devient vert (GG)
ailles	élargies et arrondies au sommet (GG)	atténuées et arrondies au sommet (GG)	tronquées transversalement au sommet (GG)
carène	bien anguleux (LeG) ; angle obtus avec le coté inf (FE)	peu anguleux (LeG) ; angle droit (FE)	angle droit (FE)
<b>fruit : longueur / S</b>	4-6 x (FVMA) ; > 4x (FE)	2 x (LeG) ; c.2 x (FVMA) ; < ou = 3 x (FE)	inclus (LeG) ; c. inclus (FVMA) ; = (FE)
<b>fruit : dimensions</b>	(1)2(3) cm x 1-1.5mm (grêle) (FE)	1/2-1 cm x 1.5-2 mm (trapu) (FE)	1/2 cm x 1.5 mm (FE)
fruit : section	comprimé (LeG)	cylindrique (LeG)	comprimé (LeG)
graines	> 12 (FE)	8-12 (FE)	3-5 (LeG)
valves déhiscentes	contournées (GG FE)	contournées (GG FE)	<u>non contournées</u> (GG FE FVMA)

<i>Lotus pérennes</i>	<i>Lotus uliginosus</i> (FE)	<i>Lotus corniculatus</i> (FE)	<i>Lotus tenuis</i> (FE) ; corniculatus var.tenuifolius (LeG)
bio	rampante, stolons (GG) ; [rhizomes méso lepto]	racine pivotante (GG)	id.
hauteur	3-8 dm (GG)	1-3 dm (GG)	2-4 dm (GG)
tige aérienne	creuse [entre 1/4 et mi hauteur surtout]	pleine	plus grele et plus rameuse (GG)
tige et feuilles : surface	bien poilu, rmt glabre (LeG)	poils épars (LeG)	glabre ou c., glauque (LeG)
folioles et stipules	fol.obové cunéiforme ou les sup rhomboidales (GG)	fol.obové cunéiforme ou linéaire aigu (GG)	linéaires aigus (GG)
stipules	largement ovale, un peu en coeur (LeG)	ovale à oblong lancéolé (LeG)	lancéolé linéaire (LeG)
pédoncule		épais (GG)	filiforme (GG)
infl : nb fleurs	5-10...	5-8 (LeG) ; (1)2-7	glt (1)2-3 (LeG) ; moins nombreuses (GG)
S : dents	linéaires-lancéolées (GG)	triangulaires à la base, brusquement subulées (GG)	
S : dents orientation juste avant l'émergence des P	réfléchies (LeG GG)	dressées conniventes (GG cLeG)	
étendard : limbe	ovale (GG) [apex en arche gothique]	orbiculaire (GG) apex rond à déprimé	
ailles	obovées, non courbées au bord inf, couvrant toute la carène (GG)	élargies au milieu, fortement courbées au bord inf, tronquées obliquement sous le sommet ne couvrant pas toute la carène (GG)	oblongues obovées, bcp plus étroites, non courbées au bord inf (GG)
carène	peu anguleux, caché en grande partie par les ailes(LeG); insensiblement atténuée en bec ensiforme (GG) ; coudée dès la partie inf du limbe, à limbe à peine prolongé au dessus de l'onglet (Cosson&G)	c.angle droit (LeG) ; brusquement rostrée (GG) ; coudée à sa partie moyenne, à limbe largment prolongé au dessus de l'onglet (Cosson&G)	
gousse			moins épaisse (GG)
habitat	[prairies humides ou méso, supporte acide]	prés (GG)	prairies humides, surtout près mer (GG)

des intermédiaires probables entre *corniculatus* et *uliginosus*, avec des stolons, peu nets, et peu de rhizomes ; et entre *corniculatus* et *tenuis* (en sous-sp pour certains auteurs)

<i>Vicia</i>	<i>Vicia</i> sauf <i>sepium</i>	<i>Vicia sepium</i>	<i>Ervum</i>	<i>Faba, bithynica</i>	<i>Cracca</i>
bio	an	rh	an		var
F				peu de folioles	
infl.	1 pédicelle (court) par fl	pédoncule à 2-5	pédoncule long	pédoncule ou 1 pédicelle	pédoncule > 15 fl
S					lèvre sup très courte
base du calice			non gibbeuse (FE)		parfois gibbeux, S bilabié
légume : base	var			sessile	stipité (Ry)
légume : apex			var		oblique

<i>Vicia</i> 1 ped/fl	<i>Vicia lutea</i>	<i>Vicia sativa</i>	<i>Vicia lathyroides</i>
hauteur	2-5 dm (SM)	jq 8 dm (FE)	jq 2 dm (FE)
stipules	tachées de brun, les inf semi-sagittées, à oreillette dentée (LeG) ; tridentées, les sup svt entières maculées (SM)	semi-sagittées, fort tachées de brun en dessous, à oreillette laciniée (LeG) ; dentées, glt tachées (GG SM FVMA) semi-sagittées (SM)	semi-sagittées, entières (LeG) ; entières, semi-sagittées, non tachées (GG SM FVMA)
folioles paires feuilles sup.	4-8 (SM)	5-7 (GG) ; 3-8 (FE, FVMA)	2-4 (GG FE FVMA))
vrilles	rameuse (SM)	ramifiée (au moins feuilles sup.) (FVMA)	non ramifiée et droite ("ou rameuse" ; GG) ; feuilles inf. sans vrille* (FVMA)
inflorescence	1-2 (SM)	par 1-2(3) (FVMA)	toujours solitaires (GG FVMA)
pédicelle	presque sessile (LeG) ; bref (SM)	bref (GG)	sessile (LeG) ; c. sessile (GG)
calice à maturité		rompu (GG)	non rompu (GG)
calice dents	fort inégales, les 2 sup presque 1/2 moins longues et conniventes (LeG) ; inégales, lancéolées subulées, les sup courtes conniventes, l'inf > tube (SM)	c. = et toutes assez droites (LeG) ; régulier (Ry) ; linéaires subulées, = tube (GG)	c. = et toutes assez droites (LeG) ; régulier (Ry) ; lancéolées subulées ; = presque le tube (GG)
corolle		1-3 cm (FE)	5-8 mm (FE)
P couleur	jaune ou blanc ou légèrement purpurin (SM)	purpurine (FVMA)	violet (FVMA)
anthères		ovales (GG SM)	orbiculaires (GG)
fruit	à la fin réfléchi, 3 x 1 cm (SM)	dressé ou étalé, 4 cm x 9 mm (SM) ; 2-7 cm x 4-10 mm (FE)	2-2,5 x 0,3 cm (SM) ; 1-3 cm x 3-4 mm; bec court courbé (FE)
fruit : base	stipité (SM Ry)	sessile (Ry)	sessile (Ry)
fruit mur : clr	noir (SM)	jaunatre (GG) ; fauve (SM)	noir (GG)
fruit mur : pilosité	poils étalés, <u>bulbeux</u> à la base (SM)	pubescent (GG)	glabre (GG SM)
graine forme	globuleuse (LeG) ; subglobuleuse (SM)	anguleuse (LeG) ; orbiculaire (GG), orbiculaire-comprimé (SM)	presque cubique (LeG) ; globuleuse cubique (GG SM)
graine : ornementation	lisse (SM)	lisse (GG SM FE)	très ponctuée (LeG) ; <u>tuberculeuse</u> (GG SM Ry FE FVMA)

<b>VICIA ERVUM</b>	<b><i>Vicia hirsuta</i></b>	<b><i>Vicia tetrasperma</i></b>	<b><i>Vicia tenuissima</i> (FE), <i>Vicia parviflora</i> (Sta3), <i>Vicia gracilis</i></b>
[tige : section]	anguleuse (SM) ; quadrangulaire à 8 sillons nets	anguleuse (SM) ; quadrangulaire à 4 sillons seuls nets	anguleuse (SM)
folioles : nb	8-10 (SM) ; (4)8-10 paires	3-5 (SM) ; 3-5(8) paires	2-5 paires (SM)
<b>folioles : forme de l'apex</b>	obtus ou tronqué (SM) ; tronqué (mucroné)	obtus mucroné (SM) ; [arche gothique(-arrondi)]	aigu (SM) [sur 1-2mm et mucron]
folioles : forme générale	linéaire-oblong (SM) ; elliptique	linéaire (SM) ; [1-2cm]	linéaire (SM FE) [svt 1/2 plus long que tetrasperma, 2-2 1/2cm]
vrille de chaque F	[glt très] rameuse [3-5 vrilles] (GG)	simple ou bifurquée [ou tri] (GG)	simple (SM)
stipules	irrégulièrement semi-sagitté, linéaire, à dents sétacées, les sup svt entier (SM) ; linéaires lancéolées, les inf. à 1 ou +s dents longues et sétacées ; (les sup. parfois entières) (GG)	semi-hasté (éperon situé du côté opposé au pétiole), entier ; parfois les sup. slmt linéaire aigu (GG cSM)	semi-sagitté, entier, les sup linéaire (SM)
<b>pédoncule : longueur / feuille</b>	< F (GG) ; c.= F (SM) ; [c.1/2 F]	= F (GG)	> F (SM FE)
pédoncule : forme apex	aristé (texte SM p135), non aristé (clé SM p132)	glt non aristé	aristé (SM)
pédoncule diamètre	1/2 mm [-1 mm]	filiforme (SM); 1/4 mm [-1/2 mm]	grele (SM)
nb fleurs / pédoncule	3-8 (SM) ; (1)3-8	1-2 (FE) ; [1-2(4)]	1-5 (SM) ; (1)2-5 (FE)
S : dents / tube	>, c.égal, linéaires subulées, S velu (SM) ; égales entre elles, = ou > tube (cle FE) [1.5-2 tube]	<, très inégales (SM) les sup. triangulaires ; inégales, < tube (cle FE) [1/2-3/4 tube]	<, c. égales (SM) ; <, inégales < tube (cle FE)
P : longueur	= S (SM) ; 2-4(5) mm (FE)	4-8 mm (FE)	(5)6-9 mm (FE)
P : couleur	blanc bleuâtre (SM)	lila, veinés de bleu et blanc (SM) [surtout l'étendard]	bleu rosé (SM)
gousse : dimensions	(1/2)-1 cm x 4 mm (c.SM)	1-1 1/2 cm x 3 mm	12-14 x 3 mm (SM)
gousse : poils	hérissé (SM) ;glt pubescent	glt glabre	glabre (SM)
gousse : forme de l'apex	bec	arrondi (Ry) ; pas de bec	arrondi (Ry)
<b>gousse : nb de graines</b>	2, bosselée (SM) ; la plupart à 2	3-5 (SM) ; (3)4(5)	6 (SM FVMA) ; 4-6 (FE)
gousse mûre : coulr	noir (SM)	brun (SM)	fauve (SM)
graine : forme	subglobuleuse lisse (SM)	globuleuse	globuleuse lisse (SM)
graine : couleur	noir ou jaunâtre marbré de noir (SM)	verdâtre marbré de noir (SM)	brun marbré (SM)
hile/circonférence de graine	1/3 (SM FE)	1/8, linéaire-oblong (SM) ; 1/5 (FE)	très petit, ovale-arrondi (SM) ; 1/12-1/8 (FE)
hile : forme		> 2 fois + long que large (cle Sta3)	à peine + long que large (cle Sta3)



<b>Cracca</b>	<b>cracca</b>	<b>tenuifolia (gr. cracca)</b>	<b>villosa varia</b>
bio	rhizome lepto.		an à racine pivotante
foliole	[+- linéaire entre 1/4 et 3/4]		[elliptique]
infl	dense (SM)	lache (SM)	lache (SM) [bof, pas forcément]
calice : base du tube	non bossu (SM) [éperon nul ou réduit < 1/4 mm sur qq fleurs]	non bossu (SM)	<b>bossu</b> à la base (SM) [=éperon de c. 1 mm]
calice : 2 dents sup.	[1/4 mm]		[1 mm]
étendard / ongle	= ongle (SM FE)	2 x l'onglet, ongle élargi au milieu (SM) ; > claw (FE)	1/2 ongle (SM FE)
[ = étendard / P]	de 1/2	de 2/3	de 1/3 (1/4)
P couleur	bleu violet	ailes blanchâtres (FVMA)	ailes plus pâles (FVMA) bof
hile / circonférence de graine	1/3 (SM) ; 1/4-1/3 (FE)	1/4 (SM) ; 1/5-1/4 (FE)	1/8 (SM) ; 1/12-1/5 (FE)

Pour *villosa*, de nombreux auteurs distinguent 2 sous-espèces ; *villosa* a des tiges à poils de svt 1 mm, étalés ; l'autre est quasi glabre, à poils bcp plus courts, non étalés.

<b>Lathyrus : sections</b>	<b>Lathyrus (in FVMA)</b>	<b>Lathyrus (in FVMA) Orobus (in GG)</b>	<b>Orobus s.s. (in FVMA &amp; ppGG)</b>	<b>Aphaca</b>	<b>Nissolia</b>
sp	<b>Eulathyrus</b> (in GG) : - <i>tuberosus</i> - <i>sylvestris</i> - <i>latifolius</i> <b>Cicercula</b> (in GG) : - <i>hirsutus</i> p481 GG	- <i>palustris</i> GG p487 - <i>pratensis</i> GG p488 - <i>sphaericus</i> + <i>angulatus</i> (proches) : GG p490	- <i>montanus</i> (= <i>Orobus tuberosus</i> ) - <i>niger</i> - <i>pannonicus</i>	<i>aphaca</i>	<i>nissolia</i>
stipules	moyennes	moyennes	moyennes	grandes	c nulles
feuille	folioles et vrille	folioles et vrille	folioles, sans vrille (juste un mucron)	sans foliole, avec vrille	sans foliole, sans vrille, c. réduite à pétiole plat
style	tordu sur son axe (GG)	droit, canaliculé dessous (GG)	droit, canaliculé dessous (GG)	droit, canaliculé dessous (GG)	droit, canaliculé dessous (GG)

<b>Lathyrus</b>	<b>bio</b>	<b>tige : section</b>	<b>feuille</b>	<b>infl. : nb fl.</b>	<b>P : couleur</b>
<i>tuberosus</i>	rh. tub.	anguleuse	vrille	c5	rose
<i>sylvestris</i>	per.	ailes		c5	rose verdâtre
<i>latifolius</i>	per.	ailes		c10	rose vif
<i>hirsutus</i>	an	ailes		1(2)	violet, puis bleuat.
<i>palustris</i>	per.	ailes étroites		c3à5	bleuatre
<i>pratensis</i>	rh.	anguleuse		7à10	jaune
<i>sphaericus</i>	an	anguleuse		1à2	rouge
<i>angulatus</i>	an	anguleuse		1	bleuatre
<i>montanus</i>	rh. tub.	ailée	mucron	2à4	violet, puis bleuat.
<i>niger</i>	rh.	anguleuse	mucron	4à10	violet, puis bleuat.
<i>pannonicus</i>	per.	anguleuse	mucron	5à8	jaunâtre
<i>aphaca</i>	an	anguleuse	vrille, sans foliole	1(2)	jaune
<i>nissolia</i>	an	anguleuse	ni vrille, ni foliole	1à2	rouge ou blanc

<b>Pisum</b>	<b>Pisum arvense</b>	<b>Pisum tuffetii</b> (in Bor SM) <b>(granulatum</b> in LI 1844 ? cf SM) <i>Pisum elatius</i> Bieb non Bor (in LI 1897)
tige : hauteur	1/2 m (cSM)	1 m (cSM) et striée (Bor LI) ; port de sativum (LI)
folioles : nb de paires	1à2 (SM) ou 0 sur certains cv de printemps ?	2à3 (SM cLI)
foliole		mucronulée (SM) mucroné (Bor LI)
stipules	ovales, dentées à la base du coté ext. (SM)	ovales, prolongées et crénelées à la base (SM) ; non maculées... (Bor)
fleur	blanc bleuatre à ailes d'un pourpre foncé (SM) ; blanc bleuatre à ailes d'un rouge noirâtre (LI)	grandes, roses, à ailes rouge noirâtre (Bor SM LI)
pédoncule	court, 1-3 fl, aristés (SM)	> largement les stipules, 1-2 fl. (SM) ; 1-2 fois + long que stipules, 1(2) fl (LI)
gousse	5 x 1 cm (SM)	6-8 cm x 10-15 mm (SM)
gousse : graines		séparées par une cloison de poils (LI)
graine : couleur, forme	gris verdâtre, marbré de brun, lisse, anguleuse (SM) ; lisse, gris verdâtre, marbré de brun clair, fort comprimée de chaque coté, anguleuse (LI)	gris, marbré de brun, finement granuleux (SM) ; globuleuse, brun (à la loupe, gris marbré de brun foncé), finement granuleuse (LI)
graine : hile / circonférence de la graine	ovale, de 1/12 (SM) ; ovale, de c1/10 (LI)	oblong, de 1/6 (LI Bor SM)
habitat	champs	bois (SM) et buissons (Bor)

+ *Pisum sativum* et *elatius* in Bor., à P blancs ou peu rosé

+ *Pisum sativum* in LI, à P blancs,...

<i>Ornithopus</i>	<i>perpusillus</i>	<i>sativus</i> (in GG FVMA) <i>roseus</i> (in Bor)	<i>compressus</i>	<i>pinnatus ; ebracteatus</i> (in Bor SM)
hauteur	1à3 dm (Bor cSM))	1à5 dm (Bor SM)	1à5 dm (Bor) 2à5 dm (SM)	2à5 dm (Bor) 1à5 dm (SM)
'plante' : poils	pubescent (Bor), rmt glabre (SM)	tige et F velues (SM)	pubescent (Bor)	glabre (Bor)
stipules	petites lancéolées, membraneuses, à pointe noire (SM)	triangulaires aiguës (SM)	les inf à petites, les moyennes et sup sans (SM)	très petites membraneuses (SM)
feuilles : pétiole	F inf pétiolées, les moyennes et sup sessiles (SM)	les inf. pétiolées, les moyennes et sup sessiles (SM)	les inf pétiolées, les moyennes et sup sessiles (SM)	toutes pétiolées (SM)
folioles : nb	6à12 paires (SM), 7-13 paires (FE)	nbses (SM) ; 9-18 paires (FE)	nbses (SM)	3à6 paires (SM)
folioles : forme	ovales, obtuses, mucronées (SM)	ovales elliptiques ou lancéolées, mucronées (SM)	elliptiques ou ovales-lancéolées (SM)	elliptiques oblongues, mucronées (SM)
pédoncule/ feuille	égal (SM FVMA)	long, grele (Bor) ; svt 1 fois + long (SM) ; 2 x feuille (FVMA)	= (GG SM)	= (GG, FVMA) et filiforme (SM)
infl. : bractée	bractée pennée sous les fl. (SM)	id	id	<u>calice sans bractées</u> (Bor cSM)
inflorescence : tete de fleurs	1-4 (Bor) ; 2-4 (SM)	3-6 (Bor SM)	1-4 (Bor) ; 3-5 (SM)	sertule de 2-4 (Bor) ; 1-4 (SM)
calice : dents / tube	< 1/2 (GG SM FE FVMA)	égal (Bor SM) ; un peu inf ou = (GG, FE, FVMA)	c. aussi longues que le tube (GG SM FE FVMA)	10 fois plus courtes que le tube (GG) ; << (SM) ; 4-6 fois (FVMA)
calice : dents		hérissé, à dents subulées (SM)	subulées (SM)	calice cylindrique (SM)
corolle : dimens.	3-5 mm	6-9 mm		
étendard / ailes	> (SM)	peu > (SM)	>> (SM)	peu > (SM)
corolle : autres pièces	ailes étalées, > carène (SM)	ailes >> carène (SM)	ailes > carène ; carène = calice (SM)	ailes peu > carène ; carène saillante hors du calice (SM)
corolle : couleur	blanchâtre, mêlé de rose et jaune (Bor) ; blanc jaunâtre, étendard veiné de rouge (SM)	rose strié de violet, assez grandes (Bor) ; rose, étendard strié de violet (SM)	jaune (GG Bor SM)	jaune à carène orangée (Bor) ; jaune, à étendard veiné de rouge, carène orangée (SM)
corolle : couleur	blanc rosé mêlé de jaune (FVMA)	rose pale, parfois ailes blanches (FVMA)	jaune (FVMA)	jaune (FVMA)
fruit : dimensions	12-18mm (SM) ; 1-2 cm x 1.5-2 mm (FE)	20-25mm (SM) ; 1-4 cm x 2-2.5 mm (FE)	2à3 cm x 3mm (SM)	2à3 cm (SM)
fruit : nb d'articles	7-9 (FVMA)	4-5 (FVMA)	5-8 (FVMA)	5-10 (FVMA)
fruit : forme	peu comprimé, pubescent, rugueux, peu arqué, bec très court (Bor) ; pubesct ou glabre, veiné-réticulé, contracté aux articulations, bec court conique genouillé au milieu (SM) ; arqué avec la concavité sup. (FVMA)	droit, glt glabre, strié ridé, bec long droit subulé (Bor) ; droit ou c, glabre ou pubesct, linéaire, comprimé, contracté aux articulations, bec conique courbé au sommet (SM) ; c. droit (FVMA)	comprimé, glt pubescent, rugueux, un peu arqué, bec atténué et crochu (cBor) ; pubesct ou rmt glabre, rugueux-réticulé, peu contracté aux articulations, sommet arqué à bec crochu (SM) ; arqué au sommet avec la concavité inf. (FVMA)	glabre, c lisse, arqué (Bor) et peu comprimé, à articles non rétrécis aux 2 bouts (SM)
graine	jaune, sans tache à l'ombilic (SM)	oblongues, jaunâtre, sans tache à l'ombilic (SM)	ovoïde-comprimée, brun à tache noire près de l'ombilic (SM)	petites, oblongues, jaunâtre, sans tache à l'ombilic (SM)

intermédiaire *perpusillus-sativus* (cf FVMA p439 et LI).

Retour page d'accueil 'plantouz' : <<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/>>